

ПАЦИЕНТ 62 ГОДА С ДИАГНОЗОМ: **ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА**

Сахарный диабет 1 типа.

Нейропатическая форма.

Язвы не заживали больше 3х лет. Пациент плохо соблюдал разгрузку, но благодаря PRP, перевязкам, антибиотикам все зажило.

Всего выполнено 6 процедур PRP на каждую ногу.



ПАЦИЕНТ 62 ГОДА С ДИАГНОЗОМ: **ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА**



ПАЦИЕНТ 62 ГОДА С ДИАГНОЗОМ: **ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА**

Выполнено 6 процедур PRP



ПАЦИЕНТ 40 ЛЕТ С ДИАГНОЗОМ: **ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА**

Сахарный диабет 2 типа.

Нейроишемическая форма.

Инфицированный язвенный дефект.

Лечение: разгрузка, антибиотики,
перевязки, 3 процедуры PRP.



До



После 3 процедур PRP


ПАЦИЕНТ 24 ГОДА С ДИАГНОЗОМ: **ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА**

Сахарный диабет 1 типа.

Синдром диабетической стопы,
нейропатическая форма.

Остеомиелит ногтевой фаланги 1-го пальца.

Инфицированный язвенный дефект 1-го пальца
левой стопы.



ПАЦИЕНТ 24 ГОДА С ДИАГНОЗОМ: **ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА**

Лечение:

1. Частичная резекция распущенной кости. Взятия биопсии костной ткани для бактериологического исследования с определением чувствительности к антибиотикам
2. Разгрузочный полубашмак до полного заживления
3. Антибактериальная терапия по результатам посева
4. Ежедневные перевязка: промывание раны по шприцу хлоргексидином, дренаж из сетчатой повязки с повидон йодом, мазь Бетадин по шприцу
5. PRP в края раны и глубокие сои мягких тканей для стимуляции заживления. (4 процедуры раз в неделю, если бы было больше – только лучше! Пациент ограничен финансово.)

Изначально все врачи говорили об ампутации. Я давал 50/50. Но, как видите, удалось сохранить палец.

Вначале рана выглядит как нейроишемическая (это из-за выраженного инфекционного процесса, а не из-за недостатка кровотока), Возможно, эта рана зажила бы и без PRP, но, скорее всего, понадобилось бы намного больше времени.

Тем более, этого пациента никто не брался консервативно лечить.

